

ADAPTIS GEL

ÁCIDO POLIACRÍLICO
0,2%



GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL

Ação:

Lubrificante ocular externo em casos de secreção lacrimal insuficiente ou lesão córnea. ADAPTIS GEL é um gel líquido claro e transparente com uma viscosidade elevada e um período prolongado de retenção ocular (8 vezes superior ao álcool de polivinil 1,4%).

Indicações:

- Casos inflamatórios oculares externos devido à secreção lacrimal insuficiente ou secreção excessiva, exposição ao vento, sol ou substâncias irritantes.
 - Síndrome do olho seco.
 - Queratoconjuntivite seca.
 - Queratoconjuntivite crônica.
 - Afecções conjuntivas causadas por fatores térmicos, químicos ou radiação.
 - Ceratite lagofálmica.
 - Ceratite neuroparalítica.
 - Ressecamento córneo pós-menopausa ou pseudo-senil.
 - Piscada pouco frequente (por exemplo, durante a anestesia, coma, leitura, trabalho em frente a telas, etc.).
 - Síndrome de Sjögren.
 - Blefaroplastia pós-cosmética da queratoconjuntivite seca.
- ADAPTIS GEL serve apenas para uso externo nos olhos. Ele não deve ser injetado intraocularmente.

Composição:

Cada 1 g de gel oftálmico contém:
Ácido Poliacrílico (Carbopol 940) 2,0 mg;
Cetrimida 0,1 mg; Sorbitol 55,0 mg; Edetato Dissódico Diidratado 0,1 mg; Hidróxido de Sódio q.s.p pH7; Água Purificada q.s.p 1g

Instruções para uso:

A frequência de aplicação será decidida de acordo com a necessidade de cada paciente. Uma a duas gotas, três a quatro vezes ao dia é a dosagem recomendada. Em alguns casos, o

produto pode ser aplicado com mais frequência. As gotas devem ser aplicadas no saco conjuntival do(s) olho(s). Durante a aplicação, o tubo deve estar na posição vertical. Ao apertar o tubo se formará uma gota que facilmente se desprenderá.

Contraindicações:

Hipersensibilidade conhecida a qualquer dos componentes da fórmula. Não aplique o produto utilizando lentes de contato. O produto não deve ser utilizado de forma intraocular.

Advertências:

Não injeite. Não engula. Em caso de dor no(s) olho(s) tratado(s), irritação ou alterações na visão, ou caso a condição piore ou dure mais de 72 horas, o uso deve ser suspenso e um médico deve ser consultado. O uso inadequado de ADAPTIS GEL como uma substância viscoelástica intraocular pode produzir uma lesão irreparável na visão.

Precauções:

Para evitar a contaminação do conteúdo do tubo, não coloque a ponta em contato com qualquer outra superfície. Feche o tubo imediatamente após o uso. Use o produto apenas caso o frasco esteja intacto. Não coloque a ponta do tubo em contato com os olhos. Quando o produto for aberto, ele não deve ser utilizado durante um período superior a um mês. Quando tiver passado esse período, o produto deve ser descartado.

Reações Adversas:

Geralmente, o gel oftálmico ADAPTIS GEL é bem tolerado pelos pacientes. Em pacientes sensíveis, queimadura, vermelhidão e dor ocular foram raramente observadas, e esses efeitos geralmente desapareciam rapidamente. Episódios de visão turva após a administração do produto são os efeitos adversos mais comuns, e parecem estar relacionados à ação prolongada e viscosidade do gel. Eles não requerem nenhum tratamento, são leves e temporários em todos os casos e não representam um motivo para suspender o tratamento. Nenhum efeito sistêmico foi apresentado com o uso do gel oftálmico ADAPTIS GEL.

Informações ao paciente:

Para evitar a contaminação do conteúdo do tubo, não coloque a ponta em contato com qualquer outra superfície. O manuseio incorreto pode contaminá-la, produzindo infecções oculares.

O uso de produtos contaminados pode causar uma lesão ocular grave, resultando em diminuição da visão.

Feche o tubo imediatamente após o uso. Use o produto apenas caso o frasco esteja intacto. Quando o produto for aberto, ele não deve ser utilizado durante um período superior a um mês. Quando tiver passado esse período, o produto deve ser descartado. Não utilize o produto após a data de validade mencionada.

Como é fornecido

Tubo contendo 10 g de gel oftálmico estéril.

Estéril - Esterilizado por filtração - DESCARTE O PRODUTO APÓS UM MÊS DA ABERTURA.

Condições de armazenamento:

Manter à temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Fabricado por:

LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.L.
Bermúdez 1004 - C1407BDR
Buenos Aires, Argentina

Registrado por:

Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda.
Rua Santa Rita D'Oeste, 282, Vila do Encontro, São Paulo-SP
CNPJ: 96.382.429/0001-60
Farmacêutica responsável:
Katia Massae Kinoshita - CRF-SP nº 15.263
Registro ANVISA Nº: 80192010034

Importado e Comercializado por:

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
CNPJ: 05.044.984/0001-26

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho

Serviço de atendimento ao consumidor
0800 - 500600 - Discagem direta Gratuita
sac@oftafarma.com.br - www.oftafarma.com.br



4410701843
552
C.V. 5 - 17
085456



552



552



DEPTO. MARKETING:

DEPTO. REGISTRO:

DESENV. EMB.:

LEGRAND

Prova nº **01FINAL** 16/03/2018

Lucas

Adaptis

Código do Material: **085456**

Dimensões: 100mm x 140mm



SURCAN S.R.L.

Alvarez Thomas 198 3°A
Buenos Aires - C1427CCO
Tel/Fax: 4553-2422
disenografico@surcan.com.ar
www.surcan.com.ar

Laboratorio/Laboratory: **LABORATORIOS POEN**

Producto/Product: **ADAPTIS GEL**
Contenido/Content: **GEL x 10 GRs.**
País/Country: **BRASIL**

Elemento/Item: **PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)**

Tamaño/Size:
ancho/wide: 100 mm
alto/high: 140 mm

Nº Material: **4410701843**
Pharmacode Nº: **552**
Código visual/Visual code: **5 - 17**

Fecha/Date: **21/MAY/15**
Version Nº: **2**

Guía de colores/Colors Guide
Pantone Black C

Colores/Colors: **1**